


Fire forsøk



www.bioforsk.no

Registreringer



- Botanisk sammensetning av plantedekket ved anleggning av feltet.
- Helhetsinntrykk, (1-9, 9 er best, 5 er tilfredsstillende) før hver sprøyting om høsten (uke 42 og uke 47/48 hvis ikke snø).
- Sjukdom, % av areal, før hver sprøyting om høsten (uke 42, og 47/48). Diagnose av sjukdom ved behov.



www.bioforsk.no



www.bioforsk.no



Spraying of plots at Landvik,
9 Nov. 2010



www.bioforsk.no



Rep II,
Landvik,
9. desember 2011



www.bioforsk.no



Spots of *M. nivale*, 9 Dec.



www.bioforsk.no

Foreløpige resultater

| Behandling | Microdochium nivale, % av ruta | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 18.okt (før første behandling) | 9.nov (før andre behandling) | 9.des (før tredje behandling) | 27.feb. (etter snø- smelting) |
| Uspøyta kontroll | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
| Trifloksystrobin + protiokonazol | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Turf G+ (sopp-preparat) | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
| Turf S+ (ennå ikke brukt) | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| Turf G+ + Turf S+ | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| Vacciplant, 1 L/ha | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| Vacciplant, 2 L/ha | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
| | ns | ns | ns | ns |


Ingen sikre forskjeller, men bare ruter med kjemisk bekjemping var helt uten sopp ved to siste registreringer

Sterf
SC ANTIKAMPEN - TURFORSK
PROTEKTORER - SLETTET - TILBUD

www.bioforsk.no



Sterf
SC ANTIKAMPEN - TURFORSK
PROTEKTORER - SLETTET - TILBUD



Sterf
SC ANTIKAMPEN - TURFORSK
PROTEKTORER - SLETTET - TILBUD

Rute 107 (ubehandlet): 17.nov

www.bioforsk.no



Sterf
SC ANTIKAMPEN - TURFORSK
PROTEKTORER - SLETTET - TILBUD

Rød grastrådkølle / trådklubba

www.bioforsk.no

Foreløpige resultater

| Behandling | Typhula incarnata, % av ruta | | Heksering, % av ruta | |
|-------------------------------------|--|---|--|---|
| | 17.Nov (en mnd etter første behandling) | 14.des (en mnd etter andre behandling) | 17.nov (en mnd etter første behandling) | 14.des (en mnd etter andre behandling) |
| Uspøyta kontroll | 0 | 1.3 | 1 | 0.7 |
| Trifloksystrobin + protiokonazol | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Turf G+ (sopp-preparat) | 1.3 | 4 | 0.5 | 0 |
| Turf S+ (ennå ikke brukt) | 0.8 | 2.3 | 1.3 | 1.3 |
| Turf G+ + Turf S+ | 0.1 | 0 | 0.3 | 5 |
| Vacciplant, 1 L/ha | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 0 |
| Vacciplant, 2 L/ha | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 0 |
| Sign. | ns | ns | ns | ns |

Ingen sikre forskjeller, men jamt over bedre virkning av kjemisk enn av biologisk bekjemping

Sterf
SC ANTIKAMPEN - TURFORSK
PROTEKTORER - SLETTET - TILBUD

www.bioforsk.no